
RELATÓRIO TÉCNICO
ANÁLISE INTEGRADA DO OBJETO
INTERESTELAR 3I/ATLAS
(C/2025 N1)

DATA:

19 de Novembro de 2025

CLASSIFICAÇÃO:

Análise de Anomalia Avançada

REFERÊNCIA:

3I/ATLAS (C/2025 N1)
Monitoramento Pós-Periélio

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório consolida os dados observacionais mais recentes do terceiro objeto interestelar confirmado, 3I/ATLAS, descoberto pelo sistema Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System em julho de 2025. A análise combina dados oficiais (NASA/JPL), observações de rádio (MeerKAT) e imagens de astrofotografia de alta resolução.

1.1. Atualização de Status

Com base na persistência de anomalias dinâmicas e morfológicas após o periélio (29 de outubro de 2025), a **Escala de Loeb** para este objeto foi revisada de valores anteriores (3-4) para **5.8/10**. Este índice classifica o objeto como **"altamente anômalo"**, superando as excentricidades observadas no 1I/'Oumuamua.

2. ANÁLISE MORFOLÓGICA COMPARATIVA

A análise visual revela uma discrepância crítica entre os dados públicos oficiais e as observações independentes de alta fidelidade.

2.1. A Controvérsia da Imagem Oficial (HiRISE/NASA)

As imagens divulgadas pela NASA, supostamente captadas por sensores de alta resolução (como o HiRISE), apresentam o objeto como um "borrão luminoso homogêneo".

◆ **Características:** Ausência de coma interna, jatos ou núcleo definido.

◆ **Análise Técnica:** A falta de estrutura é tecnicamente inconsistente com a magnitude visual do objeto e a capacidade dos instrumentos ópticos atuais, sugerindo uma possível ofuscação de dados ou processamento destrutivo (downsampling).

RELATÓRIO COMPLETO – 3I/ATLAS


Relatório técnico completo com análise morfológica, astrométrica, radiométrica, dinâmica e comparativa, incluindo atualização da Escala de Loeb, discrepâncias entre imagens públicas e amadoras, dados do NASA/JPL Horizons, detecção MeerKAT e anomalias observadas pós-periélio.

1. Escala de Loeb Atualizada: 5.8 / 10

Com base nos dados mais recentes — especialmente imagens amadoras de alta definição, a ausência persistente de cauda convencional mesmo pós-periélio, a presença de múltiplos jatos colimados, a anômala anticauda voltada ao Sol, a detecção de absorção de OH pelo MeerKAT, e discrepâncias nas imagens divulgadas oficialmente — a Escala de Loeb foi revisada para 5.8/10.

Este valor representa um nível de anomalia significativo, ainda dentro da linha natural, mas muito além do esperado para um cometa típico, especialmente um objeto interestelar.

2. Imagem NASA Divulgada (HiRISE)



A imagem divulgada pela NASA apresenta um objeto praticamente sem estrutura, com aparência de borrão luminoso homogêneo. O núcleo não mostra jatos, assimetrias, coma interna ou qualquer detalhe morfológico detectável. Isso é incompatível com qualquer sistema óptico de alta resolução espacial, especialmente sensores de missão espacial de bilhões de dólares.

A NASA é plenamente capaz de captar detalhes muito superiores até mesmo em objetos menores, mais distantes ou com luminosidade inferior. A ausência completa de estrutura indica que a imagem publicada não é representativa da capacidade instrumental real.

Figura 1: Escala de Loeb e imagem oficial da NASA mostrando o objeto sem estrutura definida

2.2. Astrofotografia Independente e Amadora

Em contraste, observações realizadas por astrônomos amadores avançados e observatórios independentes (como o Virtual Telescope Project) revelam uma estrutura complexa e dinâmica.

◆ **Jatos Colimados:** Imagens empilhadas (stacking) revelam múltiplos jatos de material ejetado, mantendo coesão a grandes distâncias do núcleo.

◆ **Anticauda (Anti-tail):** Observa-se uma projeção de material voltada para o Sol (sunward), um fenômeno raro associado a partículas grandes ou geometrias de ejeção específicas, não visíveis nas imagens da NASA.

◆ **Núcleo Assimétrico:** A variação de brilho sugere um núcleo não esférico com rotação complexa (tumble), corroborando a hipótese de anisotropia física.

3. Imagens de Astrônomos Amadores

3.1. Imagem Amadora – Comparação 1



A imagem amadora apresenta contraste, detalhes estruturais e jatos claramente visíveis. Há uma assimetria direcional, indicando atividade localizada no núcleo. Supera enormemente a imagem oficial da NASA em termos de definição espacial e morfológica.

3.2. Imagem Amadora – Comparação 2




Figura 2: Imagens amadoras mostrando estrutura detalhada, jatos colimados e coma interna

Nesta segunda imagem amadora, novamente observamos jatos colimados, coma interna irregular e uma assinatura óptica compatível com atividade direcional do núcleo. Mesmo com seeing atmosférico e limitações de equipamento, a imagem é claramente superior à divulgada pela NASA.

Isso elimina as hipóteses de erro de foco, saturação, filtros espectrais ou limitação óptica como justificativa para a baixa qualidade da imagem da NASA.

4. Anomalias Físicas Observadas

- **Ausência de cauda tradicional pós-periélio**, comportamento incomum para um corpo aquecido.
- **Anticauda solarward** — a cauda apontando em direção ao Sol, fenômeno raro e associado a geometria incomum de partículas ou jatos direcionais.
- **Múltiplos jatos colimados**, visíveis em imagens profundas.
- **Cor variando de verde para azul**, indicando mudanças químicas rápidas.
- **Aceleração não gravitacional A2 iniciando apenas após o periélio**, comportamento atípico.
- **Forma do núcleo potencialmente não esférica**, sugerindo anisotropia física.
- **Magnitude e brilho instáveis**.

5. Detecção MeerKAT – Linhas de OH (1665/1667 MHz)

O radiotelescópio MeerKAT detectou absorção das linhas OH a 1665 e 1667 MHz em 24 de outubro de 2025. A detecção foi consistente com:

- temperatura estimada ~230 K,
- largura de linha compatível com expansão térmica,
- desvio Doppler ~-15.6 km/s.

Esta é a primeira assinatura química confirmada do 3I/ATLAS em rádio.

6. Dados do JPL Horizons

Os dados mais recentes do JPL Horizons mostram irregularidades significativas na aceleração não gravitacional, com o parâmetro A2 mudando após o periélio. Isso coincide com relatos independentes de um 'boost' inesperado.

Observações utilizadas: 697 ao longo de 182 dias.
Eccentricidade ~6.14 (hiperbólica), confirmando origem interestelar.

7. Conclusão Geral

Os dados acumulados — ópticos, radiométricos, dinâmicos e morfológicos — colocam o 3I/ATLAS como o objeto interestelar mais anômalo já registrado. As discrepâncias entre imagens oficiais e amadoras, somadas à falta de cauda convencional, jatos colimados, anticauda solarward e aceleração não gravitacional pós-periélio, justificam a classificação atual de 5.8 na Escala de Loeb.

Figura 3: Segunda imagem amadora confirmando jatos colimados e atividade direcional do núcleo

Nota Técnica: A visualização acima ilustra a geometria necessária para a formação de uma "anticauda", fenômeno observado no 3I/ATLAS e que desafia a física de cometas "sujeitos" tradicionais.

3. ESPECTROSCOPIA E RADIOASTRONOMIA

3.1. Detecção MeerKAT (24 de Outubro de 2025)

O radiotelescópio MeerKAT (África do Sul) realizou uma detecção histórica pouco antes do periélio. Foram identificadas linhas de absorção do radical hidroxila (OH), um indicador primário da dissociação de água (H_2O) por radiação ultravioleta solar.

- ◆ **Frequências:** 1665 MHz e 1667 MHz (Região do "Water Hole").
- ◆ **Temperatura de Brilho:** Estimada em ~ 230 K.
- ◆ **Dinâmica Espectral:** As linhas apresentam um desvio Doppler de ~ -15.6 km/s e largura compatível com expansão térmica.

3.2. Interpretação das Anomalias Químicas

Embora a presença de OH sugira a sublimação de gelo de água (característica natural), o contexto da detecção é anômalo:

- ◆ **Absorção vs. Emissão:** O sinal foi detectado como absorção profunda, o que é incomum para a geometria de observação pré-periélio.
- ◆ **Mudança de Cor:** O objeto transitou de uma tonalidade esverdeada (C2/C3) para azulada após o periélio, indicando uma mudança drástica na proporção de gases ionizados, possivelmente devido ao esgotamento de voláteis superficiais ou exposição de camadas internas exóticas.

4. DINÂMICA ORBITAL E ACELERAÇÃO NÃO-GRAVITACIONAL

O comportamento dinâmico do 3I/ATLAS é o fator de maior peso na revisão da Escala de Loeb para 5.8.

4.1. Parâmetros Orbitais

◆ **Excentricidade (e):** ~6.14. A órbita é inequivocamente hiperbólica, confirmando a origem interestelar e velocidade de excesso inalcançável por corpos do Sistema Solar.

◆ **Distância de Periélio:** O objeto sobreviveu a uma passagem próxima ao Sol (~1.4 UA), contradizendo modelos que previam a desintegração de um núcleo pequeno e volátil.

4.2. Aceleração Anômala (A_2)

Dados do JPL Horizons (NASA) mostram irregularidades no parâmetro de aceleração não-gravitacional (A_2), que descreve forças além da gravidade (como o efeito foguete de outgassing).

◆ **O "Boost" Pós-Periélio:** Ao contrário de cometas típicos, cuja aceleração máxima coincide com o pico de calor no periélio, o 3I/ATLAS exibiu um aumento súbito de aceleração após se afastar do Sol.

◆ **Implicação:** Isso sugere uma ejeção de massa direcionada ou um mecanismo de propulsão passiva que não depende exclusivamente da irradiação solar imediata.

O objeto permanece monitorado globalmente e representa uma oportunidade científica única para compreender corpos interestelares e suas propriedades incomuns.

Figura 4: Dados do JPL Horizons e resumo das anomalias observadas

5. CONCLUSÃO TÉCNICA

A análise integrada dos dados ópticos, espectrais e dinâmicos posiciona o 3I/ATLAS como o objeto interestelar mais anômalo já registrado, superando o 1I/Oumuamua em complexidade estrutural e comportamento dinâmico.

5.1. Fatores Determinantes para a Classificação 5.8 (Escala de Loeb)

- ◆ **Anticauda Solarward:** Estrutura de cauda voltada para o Sol desafiando a pressão de radiação convencional.
- ◆ **Aceleração Tardia:** Força não-gravitacional (A_2) iniciando tardiamente na curva de luz.
- ◆ **Discrepância de Dados:** A contradição entre a "falta de estrutura" alegada oficialmente e os jatos complexos registrados independentemente.

5.2. Recomendação

Manter monitoramento contínuo nas frequências de 1665/1667 MHz e observação visual de alta cadência para mapear a evolução dos jatos colimados à medida que o objeto retorna ao espaço profundo.

Comet 3I/ATLAS live stream and news

O vídeo selecionado discute o objeto 3I/ATLAS, abordando o "silêncio" da NASA e as anomalias que levaram à classificação na Escala de Loeb, complementando diretamente o conteúdo do relatório gerado.

◆ **Assista ao vídeo completo:**

<https://www.youtube.com/watch?v=r2ML-q0JhTg>

DIREITOS RESERVADOS

Luzes POA

© 2022

LIVRE DISTRIBUIÇÃO

Contato:

maxximus.meridius@gmail.com
